inO CAL - Ultra

NUTRITION CALCIUM
RENFORCÉE EN PHOSPHORE

ENGRAIS CE - Solution de Chlorure de Calcium

COMPOSITION

CaO	200 g/L
P_2O_5	42,5 g/L

CARACTÉRISTIQUES

Formulation	Formulation acidifiante
Utilisation	Foliaire
Conditionnement	10 L (palette 600L)
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel
Conservation du produit	18 mois
Effet acidifiant sur la bouillie	Imporant
Forme	Liquide - (SL)
Densité	1,32

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

Rôles des éléments

Calcium :
- Amélioration des composants de qualité du rendement (conservation, fermeté, calibre, etc)
- Intervient dans l'activité méristématique

Phosphore :
- Transport de l'énergie
- Constituant des membranes
- Synthèse des protéines

Caractéristiques

inO CAL-ULTRA prévient tout déséquilibre physiologique et nutritionnel en cours de végétation (Tip Burn, nécrose apicale, vitrescence...).

inO CAL-ULTRA grâce à la synergie équilibrée Calcium /Phosphore étudiée pour les fruits et légumes, favorise le calibre, la conservation et la résistance aux chocs et meurtrissures. Le choix rigoureux des matières premières garantit une solubilité à 100%.

CAPFOL est un produit liquide prêt à l'emploi avec une action très «douce» sur les fruits : facilité l'utilisation, sécurité d'emploi et sécurité pour les consommateurs.

Intérêts de la formulation

Base Acidifiante pH actif = Complexant Organique et Tamponnant
- Pénétration optimale et rapide des éléments. Tauxd'absorption proche de 100 %
- Meilleure affinité de la bouillie acide avec la cuticule végétale
- Pas de précipitation des éléments sur le Calcium de l'eau (insolubilisation)
- Très compatible avec la plupart des produits phytosanitaires
- Acidifie et stabilise le pH (pouvoir tampon)
- Solubilise des éléments nutritifs présents dans la feuille
- Particulièrement recommandé dans le cas d'une eau dure et/ou calcaire

MODE D'EMPLOI

Principales cultures	Doses /ha	Concentration maximale d'utilisation	Périodes d'application
Arbres fruitiers	6-8 L	2 %	Applications espacées de 15 jours, dès le grossissement du fruit et jusqu'à la récolte. (Prévoir 7 applications pour les variétés de pommes plus sensibles au Bitter Pit).
Cultures légumières * (tomate, laitue, melon, céléri...)	6 L	1,5%	3 à 5 applications, tous les 10 jours sur feuillage suffisamment développé.
Vigne	5 L	2 %	2 à 4 applications espacées de 10-15 jours dès la fin de la floraison.
Autres cultures	6 L	2%	2 à 4 applications espacées de 10 – 15 jours, sur feuillage suffisamment développé.

* Pour les cultures sous abri, procéder à un test préalable à la concentration de 1 % pour observer le comportement de la végétation.

CONSEILS PRATIQUES

Préparation de la bouillie

Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau / ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur l'ensemble du feuillage sans ruissellement. Préférer les traitements aux températures comprises entre 6 et 25 °C.
- Agiter le bidon pour homogénéisation.
- Verser progressivement le produit, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche.
- Rincer l'emballage deux fois.

En cas de mélange avec d'autres produits, effectuer toujours un test préalable et incorporer ce produit en dernier.

inO NUTRITION